НОВІ ПРОДУКТИ 2027

Агрохімічні технології

ГРА ВИСОКОГО РІВНЯ

ТОРРЕС

Агрохімічні технології

ТОРРЕС

Унікальний комбінований системний післясходовий гербіцид із ґрунтовою дією для захисту кукурудзи від однорічних і багаторічних злакових та дводольних видів бур'янів із максимально широким вікном застосування

Агрохімічні технології

Склад:

Темботріон 100 г/л + нікосульфурон 40 г/л + ізоксадіфен-етил 50 г/л

Препаративна форма:

Масляна дисперсія (МД)

Хімічна група:

Трикетони + сульфонілсечовини (Група F2+B, код HRAC 27+2)

Розподіл у рослині:

Системний

Культури і норми застосування:

Кукурудза: 0,8-1,0 л/га

Інформація про державну реєстрацію ТОРРЕС

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/га
Кукурудза	Однорічні і багаторічні злакові, однорічні і деякі багаторічні дводольні бур'яни	2-8 листки	0,8-1,0

*Обов'язкове використання з олійним ПАР

Агрохімічні технології

Властивості та переваги ТОРРЕС

Розширений спектр дії

Унікальне поєднання діючих речовин забезпечує найширший спектр контролю бур'янів у посівах кукурудзу поміж усіх гербіцидів представлених на ринку України

Посилена ефективність

Синергетичний ефект від спільного застосування темботріону та нікосульфурону забезпечує більш надійний контроль над бур'янами

Контроль проблемних бур'янів:

ваточник сирійський, лобода біла, падалиця соняшнику та ріпаку, багаторічні злакові бур'яни і падалиця зернових культур

Запобігання виникненню резистентності

Діючі речовини з різним механізмом дії

Широке вікно застосування

Можливість використання впродовж тривалого періоду вегетації кукурудзи (до 8 листків)

Висока селективність до культури

Досягається комбінацією діючих речовин, безпечних для культури, у поєднанні з антидотом

Швидка та тривала дія

Швидке проникнення в рослину та тривалий захист від нових хвиль бур'янів завдяки ґрунтовій дії темботріону

Ефективна препаративна форма

Забезпечує максимальне поглинання діючих речовин рослиною, що оптимально навіть в умовах нестабільної погоди

Спектр дії TOPPEC на дводольні бур'яни

Чутливі

- Амбрзія полинолиста
- Амброзія трироздільна
- Вероніка персидська
- Вероніка плющелиста
- Галінсога дрібноквіткова
- Гірчиця польова
- Глуха кропива пурпурова
- Гречка татарська
- Грицики звичайні
- Дурман звичайни
- Жовтозілля звичайне
- Зірочник середній
- Канатник Теофраста
- Коноплі звичайні
- Латук дикий (розетка)
- Лобода, види
- Лутига розлога
- Нетреба, види
- Осот жовтий
- Падалиця ріпаку класичного
- Падалиця ріпаку стійкого до імідазолінонів
- Падалиця соняшнику класичного
- Падалиця соняшнику (в т.ч. IMI і сульфостійкі)
- Паслін чорний
- Переліска однорічна
- Редька дика
- Ромашка лікарська
- Талабан польовий
- Щириця жмидовидна
- Щириця загнута
- Щириця звичайна

Середньочутливі

- Берізка польова
- Ваточник сирійський
- Гірчак березковидний
- Гірчак звичайний (спориш)
- Гірчак почечуйний
- Гірчак шорсткий
- Кропива жалка
- Осот польовий (рожевий)
- Падалиця гречки
- Підмаренник чіпкий (до 10 кілець)
- Хвощ польовий

Стійкі

- Гібіск трійчастий
- Злинка канадська
- Молочай, види
- Портулак городній

Спектр дії TOPPEC на злакові бур'яни

Чутливі

- Вівсюг звичайний
- Гумай (сорго алепське)
- Лисохвіст польовий
- Метлюг звичайний
- Мишій зелений
- Мишій сизий
- Падалиця зернових: пшениця, ячмінь, овес, жито, тритикале
- Пирій повзучий
- Плоскуха звичайна (куряче просо)
- Просо звичайне
- Райграс (до кущення)

Середньочутливі

- Пальчатка кровоспиняюча (до кущення)
- Свинорий пальчастий
- Стоколос, види
- Тонконіг однорічний

Стійкі

- Просо волосовидне
- Просо селянське

Місце Торрес в системі захисту кукурудзи

Норма внесення

Торрес
0,8-1,0 л/га

Обов'язкове додавання олійного ПАР

ФОРМУЛА СИЛЬНОГО СТАРТУ

ГАРДЕКС

Агрохімічні технології



ГАРДЕКС

Високоефективний чотирикомпонентний інсекто-фунгіцидний протруйник для надійного захисту насіння зернових колосових культур та сої від широкого спектра патогенів і шкідників

Агрохімічні технології

Склад:

Клотіанідин, 350 г/л + протіоконазол, 50 г/л + дифеноконазол, 50 г/л + азоксистробін, 30 г/л

Препаративна форма:

Концентрат, який тече для обробки насіння (ТН)

Хімічна група:

Неонікотиноїди, триазолінтіони, триазоли, метоксиакрилати

Мобільність у рослині:

Системний (ксилемно-мобільний), локально-системний

Культури і норми застосування:

Зернові колосові: 0,8-1,0 л/т;
Соя: 1,0-1,5 л/т

Інформація про державну реєстрацію ГАРДЕКС

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/т
Пшениця, ячмінь	Сажки (карликова, летюча, тверда), пліснявіння насіння, кореневі та прикореневі гнилі, септоріоз, альтернаріоз	Передпосівне протруювання насіння	0,8-1,0
	Злакові мухи, попелиці, цикадки		
Соя	Фузаріоз, альтернаріоз, аскохітоз, антракноз, пліснявіння насіння		1,0-1,5
	Дротяники, несправжні дротяники, личинки паросткової мухи		

Агрохімічні технології

Властивості та переваги ГАРДЕКС

1. Оптимізація часу та технологічних процесів
2. Економія коштів на логістиці та пакуванні
3. Комплексний інсектицидний та фунгіцидний захист насіння сої і зернових культур
4. Посилений контроль сажкових хвороб (карликова, летюча, тверда)
5. Якісний захист від кореневих та прикореневих гнилей
6. Високоефективний контроль ґрунтових та ранньопіслясходових шкідників
7. М’яка дія, відсутність ретардантного ефекту
8. Стимуляція кореневої системи, фізіологічний ефект

СИЛА ҐРУНТОВОГО КОНТРОЛЮ

ЛАНТІС

Агрохімічні технології

ЛАНТІС

Унікальний комбінований ґрунтовий гербіцид системної дії для контролю злакових і дводольних бур'янів у посівах соняшнику, сої та кукурудзи

Агрохімічні технології

Склад:

Тербутилазин 290 г/л + S-метолахлор 234 г/л + пропізохлор 305 г/л

Препаративна форма:

Суспензійна емульсія (СЕ)

Хімічна група:

Хлорацетаміди + триазини
(Група К3+С1, код HRAC 15+5)

Розподіл у рослині:

Системний

Культури і норми застосування:

Соняшник, соя, кукурудза

Інформація про державну реєстрацію ЛАНТІС

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/га
Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сходів культури	2,0-3,0
Соя		Обприскування ґрунту до сходів культури	2,0-2,6
Кукурудза		Обприскування ґрунту до посіву, після посіву або по сходах у фазу від 3 до 5 листків культури (не більше 2 справжніх листків бур'янів)	2,0–3,0

Властивості та переваги ЛАНТІС

Широкий спектр контролю бур'янів
Ефективно контролює основні однорічні злакові та дводольні бур'яни, що спричиняють найбільші втрати врожаю

Одне рішення для злакових і дводольних бур'янів
Дозволяє одночасно контролювати обидві групи бур'янів без необхідності застосування додаткових ґрунтових гербіцидів

Надійний контроль проблемних видів
Забезпечує високу ефективність проти щириці, лободи, мишію, плоскухи, ромашки та інших поширених бур'янів

Чисте поле в критичні фази розвитку культури
Створює оптимальні умови для стартового росту та формування врожайності культури

Оптимізація витрат та навантаження на техніку
Одна гербіцидна обробка дозволяє ефективно вирішити проблему змішаного типу забур'яненості

Гнучкість застосування на кукурудзі
Широке вікно застосування дозволяє обрати оптимальний час для застосовування

Максимальна реалізація потенціалу врожайності
Зменшення забур'яненості сприяє ефективнішому використанню добрив, вологи та генетичного потенціалу культури

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду ЛАНТІС

Чутливі

- Волошка синя
- Галінсога дрібноквіткова
- Грицики звичайні
- Жабрій звичайний
- Зірочник середній
- Калачики (сходи з насіння)
- Кропива глуха
- Куряче просо
- Курячі очка польові
- Лисохвіст
- Лобода біла
- Лутига розлога
- Мак дикий
- Мишій зелений
- Мишій сизий
- Плоскуха звичайна
- Портулак городній
- Приворотень польовий
- Ромашка (види)
- Рутка лікарська
- Сокирки польові
- Суріпиця звичайна
- Талабан польовий
- Тонконіг однорічний
- Триреберник непахучий
- Шпергель звичайний
- Щавель кінський (з насіння)
- Щириця жмидовидна
- Щириця загнута
- Щириця звичайна

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду ЛАНТІС

Середньочутливі

- Амброзія (види)
- Вероніка (види)
- Види кропиви (сходи з насіння)
- Вівсюг звичайний
- Гібіск трійчастий
- Гірчак березковидний
- Гірчиця польова
- Дурман звичайний
- Жовтозілля звичайне
- Канатник Теофраста (з глибини до 2 см)
- Кучерявець Софії
- Лутига розлога
- Пальчатка (види)
- Паслін чорний
- Підмаренник чіпкий (з глибини до 2 см)
- Редька дика
- Свиріпа звичайна
- Сорго алепське (гумай)
- Фіалка польова

Стійкі

- Берізка польова
- Ваточник сирійський
- Куколиця біла
- Молочай (види)
- Нетреба звичайна
- Осот (види)
- Пирій повзучий
- Свинорий пальчастий
- Сухоребрик (види)
- Пирій повзучий

Застосування гербіциду ЛАНТІС у посівах кукурудзи

ВВСН 00

Обприскування ґрунту до посіву, після посіву
або по сходах **у фазу від 3 до 5 листків культури**
(не більше 2 справжніх листків бур'янів)



Норма внесення

Лантіс
2,0–3,0 л/га

До фази ВВСН 15

ПЕРЕВАГА З ПЕРШОГО УДАРУ

АКАРТІС ПРО

Агрохімічні технології

АКАРТІС ПРО

Потужний інсектоакарицид контактно-кишкової дії з трансламінарними властивостями, що ефективно контролює усі стадії розвитку кліщів та супутні шкідники у посівах сільськогосподарських культур

Склад:

Тебуфенпірад, 350 г/л + абамектин, 50 г/л

Препаративна форма:

Концентрат емульсії

Хімічна група:

Піразоли, авермектини

Вплив на шкодочинний об'єкт:

Контактний, кишковий, овіцидна дія

Розподіл у рослині:

Контактний, трансламінарний

Культури і норми застосування:

Соя: 0,25-0,45 л/га

Агрохімічні технології

Інформація про державну реєстрацію АКАРТІС ПРО

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/га	Макс. кратність обробок
Соя	Кліщі, трипси, попелиці	Обприскування в період вегетації	0,25-0,45	2

Властивості та переваги АКАРТІС ПРО

1

Комплексний підхід

Унікальне поєднання акарицидних та інсектицидних властивостей

2

Контроль усіх стадій розвитку кліща

Швидка зупинка подальшого розмноження

3

Трансламінарна дія

Знищення шкідника в зоні локалізації

4

Висока швидкість дії

Препарат працює одразу після контакту з шкодочинним об'єктом

5

Комбінований механізм дії

Запобігає розвитку резистентності

6

Тривалий період захисної дії

Дозволяє зменшити загальну кількість обробок

Місце АКАРТІС ПРО в системі захисту сої

Застосування при **першій** появі шкідника

АКАРТІС ПРО
Інсектоакарицид



Поліпшення **покриття** рослин та шкідника

СИЛІОН
Ад'ювант

БЛИСКАВИЧНА ДІЯ ПО БУР’ЯНАХ

МОЛТЕКС

Агрохімічні технології

МОЛТЕКС

Гербіцид системної дії для контролю однорічних та багаторічних дводольних бур'янів у посівах зернових культур, кукурудзи і гороху

Склад:

МЦПА у формі диметиламінної солі, 918,6 г/л (у кислотному еквіваленті – 750 г/л)

Препаративна форма:

Розчинний концентрат (РК)

Хімічна група:

Фенокси-карбоксилати, (Група О, кож HRAC: 4)

Розподіл у рослині:

Системний

Культури і норми застосування:

Зернові, кукурудза, горох

Агрохімічні технології

Інформація про державну реєстрацію МОЛТЕКС

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/га
Пшениця	Однорічні і деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 2 листка до прапорцевого листка	0,7-1,0
Ячмінь			
Кукурудза	Однорічні і деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 2-6 листків	0,5-0,8
Горох	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 3-5 листків культури	0,3-0,5

Агрохімічні технології

Властивості та переваги МОЛТЕКС

1 Швидка дія
Візуальні прояви гербіцидної дії видно вже через 24 години

2 Сезонна гнучкість
Можливість застосування на зернових восени

3 Пригнічення проблемних бур'янів:
хвощ польовий, берізка польова, вероніка (види)

4 Широке вікно застосування:
до прапорцевого листка на зернових

5 Відсутність обмежень у сівозміні
Після застосування Молтекс можна висівати усі с/г культури

6 Широкий спектр контролю
Контроль дводольних бур'янів та падалиці стійкої до імідазолінонів і сульфонілсечовин

7 Ідеальний партнер для бакових сумішей
Добре комбінується із флорасуламом, сульфонілсечовинами, дикамбою та іншими гербіцидами для розширення спектру дії

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду МОЛТЕКС

Чутливі

- Галінсога дрібноквіткова
- Гірчиця польова
- Гречка татарська
- Грицики звичайні
- Жовтець польовий
- Жовтозілля звичайне
- Жовтушник розчепірений
- Зірочник середній
- Кучерявець Софії
- Латук дикий (розетка)
- Лобода, види
- Лутига розлога
- Мак дикий
- Нетреба, види
- Осот жовтий
- Падалиця ріпаку класичного
- Падалиця ріпаку стійкого до імідазолінонів
- Падалиця соняшнику імі стійка стійка
- Падалиця соняшнику класична
- Падалиця соняшнику сульфо стійка
- Подорожник великий
- Редька дика
- Сокирки польові
- Сухоробрек Льозеля
- Талабан польовий
- Талабан польовий
- Хвощ польовий (надземна частина)
- Щириця жмидовидна
- Щириця загнута
- Щириця звичайна

При нормі застосування Молтекс 0,75 л/га

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду МОЛТЕКС

Середньочутливі

- Амбрзія полинолиста (до 4 листка)
- Амброзія трироздільна (до 4 листків)
- Берізка польова
- Вероніка персидська
- Вероніка плющелиста
- Волошка синя
- Гірчак березковидний
- Гірчак звичайний (спориш)
- Гірчак почечуйний
- Гірчак шорсткий
- Злинка канадська
- Осот польовий (рожевий)
- Підмаренник чіпкий (до 4 кілець)
- Полин гіркий
- Полин зелений
- Фіалка польова
- Щавель кінський

Стійкі

- Гібіск трійчастий
- Горобейний польовий
- Гороошок мишачий
- Кропива пурпурна стеблообгортаюча
- Кульбаба лікарська
- Мак довгоголовий
- Молочай, види
- Петрушка собача
- Подорожник ланцетолистий
- Портулак городній
- Ромашка лікарська
- Триреберник непахучий

При нормі застосування Молтекс 0,75 л/га

Місце Молтекс в системі захисту кукурудзи

BBCH 12

Обприскування посівів у фазі **2-8 листків**



Норма внесення

Молтекс

0,7-1,0 л/га

BBCH 16

Місце Молтекс в системі захисту пшениці

ПОДВІЙНА ДІЯ НА БУР’ЯНИ

ІМПРЕГО

Агрохімічні технології

ІМПРЕГО

Системний гербіцид з грунтовою дією для контролю однорічних злакових і дводольних бур'янів у посівах сої, гороху та гібридів соняшнику і ріпаку стійких до імідазолінонів

Агрохімічні технології

Склад:

Імазамокс 50 г/л

Препаративна форма:

Розчинний концентрат (РК)

Хімічна група:

Імідазолінони
(Група B, код HRAC: 2)

Розподіл у рослині:

Системний

Культури і норми застосування:

Гібриди соняшнику та ріпаку стійкі до імідазолінонів, соя, горох

Інформація про державну реєстрацію ІМПРЕГО

Культура	Цільові об'єкти	Способи та час обробки	Норма витрати препарату, л/га
Соняшник	Однорічні дводольні і злакові бур'яни	Обприскування посівів у фазу від 2 до 8 справжніх листків культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – сім'ядолі – 4 листки). Гібриди стійкі до імідазолінонів.	0,8-1,0
Соя		Обприскування посівів у фазі 1-3 трійчастих листків культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – сім'ядолі – 4 листки).	0,6-0,8
Горох		Обприскування посівів у фазі 2-6 справжніх листків культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – сім'ядолі – 4 листки).	0,6-0,8
Ріпак		Обприскування посівів у фазі 2-6 справжніх листків культури (злакові бур'яни у фазі 1–3 листки, дводольні – сім'ядолі – 4 листки). Гібриди стійкі до імідазолінонів.	0,8-1,0

Властивості та переваги ІМПРЕГО

Широкий спектр контролю бур'янів
Однорічні дводольні та злакові бур'яни: включаючи амброзію, щирицю, лободу, нетребу, падалицю соняшнику класичного та просо куряче

Подвійна дія
Проникає в бур'яни як через листя, так і через кореневу систему, забезпечуючи контроль наступних хвиль сходів

Тривалий захисний ефект
Довготривалий контроль бур'янів та зменшення конкуренції за вологу, живлення і світло у критичні фази розвитку культури

Висока ефективність у ранні фази бур'янів
Особливо сильний контроль молодих активно вегетуючих бур'янів у фазах 2–4 листків

Системна дія по всій рослині
Швидко переміщується до точок росту бур'янів, зупиняючи поділ клітин і ріст рослини

Гнучкість у застосуванні
Використання у різних технологіях вирощування

Зниження гербіцидного навантаження у системі захисту
Дозволяє оптимізувати бакові суміші та зменшити кількість післясходових обробок

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду ІМПРЕГО

Чутливі

- Амброзія полинолиста (2 листка)
- Амброзія трироздільна (2 листка)
- Герань (види)
- Гірчиця польова
- Дурман звичайний
- Жабрій звичайний
- Жовтозілля звичайне
- Зірочник середній
- Кропива глуха пурпурова
- Курячі очка польові
- Кучерявець Софії
- Лобода біла (до 4 листків)
- Лутига розлога (до 4 листків)
- Нетреба звичайна
- Осот жовтий (городній)
- Падалиця ріпаку класичного
- Падалиця соняшнику класична
- Переліска однорічна
- Редька дика
- Талабан польовий
- Триреберник непахучий
- Череда трироздільна
- Щириця жмидовидна
- Щириця загнута
- Щириця звичайна

https://www.weedscience.org/

Чутливість дводольних бур'янів до гербіциду ІМПРЕГО

Середньочутливі

- Берізка польова
- Вероніка (види)
- Волошка синя
- Галінсога дрібноквіткова
- Гірчак березковидний
- Гірчак звичайний (спориш)
- Гірчак шорсткий
- Горобейник польовий
- Грицики звичайні
- Канатник Теофраста
- Мак дикий
- Осот польовий (рожевий)
- Паслін чорний
- Підмаренник чіпкий (до 4 кілець)
- Ромашка (види)
- Сухоребрик Льозеля
- Фіалка (види)

Стійкі

- Ваточник сирійський
- Види бурянів із зареєстрованою резистентністю до імідазолінонів*
- Горошок мишачий
- Злинка канадська
- Кульбаба лікарська
- Латук, види
- Мак довгоголовий
- Молочай, види
- Портулак городній
- Хвощ польовий

* https://www.weedscience.org/

Чутливість злакових бур'янів до гербіциду ІМПРЕГО

Чутливі

- Вівсюг звичайний
- Метлюг звичайний
- Мишій зелений
- Мишій сизий
- Плоскуха звичайна (куряче просо)

Середньочутливі

- Бромус житній
- Гумай (сорго алепське)
- Падалиця зернових: пшениця, ячмінь, овес, жито, тритикале
- Пальчатка кровоспиняюча (до кущення)
- Пирій повзучий
- Тонконіг однорічний

Стійкі

- Лисохвіст польовий
- Осока (види)
- Свинорий пальчастий
- Стоколос (види)
- Егілопс циліндричний

Місце ІМПРЕГО в системі захисту ІМІ соняшнику

Норма внесення

Імпрего

0,8-1,0 л/га

Місце ІМПРЕГО в системі захисту сої

Обприскування посівів **у фазі 1-3 трійчастих листків**



Норма внесення

Імпрего

0,6-0,8 л/га

Місце ІМПРЕГО в системі захисту IMI ріпаку